

## CHECKLIST voor PERIODIEKE TUBERCULOSE SCREENING <sup>1</sup>

Gelieve alle nieuwe asielzoekers / nieuwkomers (van 5 jaar en ouder) in België regelmatig te screenen op klinische symptomen en risicofactoren voor Tb en dit op zijn minst **6 maand en 12 maand na aankomst in België** alsook op elk moment wanneer u dit opportuun lijkt.

U kunt de **checklist** hieronder gebruiken om deze periodieke screening uit te voeren.

Gebruiksaanwijzing van de checklist:

Voor elk positief symptoom of risicofactor → tel de overéénkomstige score (aantal punten) op.

Indien u in totaal aan **4 punten of meer** komt → graag doorverwijzen voor verder onderzoek (Rx thorax min).

A.	Sleutelsymptomen aanwezig ?	Score	
	Chronische hoest ( > 3 weken)	+ 2 p.	
	Hemoptoe (ophoesten van bloed)	+ 4 p.	
B.	Andere symptomen aanwezig ?	Score	
	Lichte koorts (van onbekende oorsprong)	+ 1 p.	
	Nachtelijk zweten	+ 1 p.	
	Vermagering en verlies eetlust	+ 1 p.	
	Langdurige vermoeidheid en/of lusteloosheid	+ 1 p.	
	Pijn t.h.v. borstkas bij ademen en of bij hoesten	+ 1 p.	
C.	Risico factoren aanwezig ?	Score	
	Immunodepressie door ziekte (HIV...), een behandeling etc..	+ 1 p.	
	Antecedenten van Tuberculose	+ 1 p.	
TOTAAL	Totaal van alle punten =		
Conclusie	Als totaal score = of > 4 punten → doorverwijzen voor Rx thorax !		

---

<sup>1</sup> Deze checklist is een hulpmiddel dat ontwikkeld werd door de VRGT, FARES en Fedasil op basis van een vragenlijst van de Zwitserse pulmonaire Liga en eigen ervaringen. Ze vervangt de systematische screening via Rx thorax op 6 maand en 12 maand, doch niet de inkomstscreening / eerste Rx die aanbevolen blijft voor elke nieuwe asielzoeker / nieuwkomer. De checklist bevindt zich nog in testfase en uw commentaren zijn dan ook welkom!